

ANNEXE : MEDICAMENTS INDICUES DANS LA PREVENTION ET/OU LE TRAITEMENT DE LA MALADIE THROMBOEMBOLIQUE VEINEUSE EN MEDECINE (données issues des RCP et des RBP)

	DCI	INDICATIONS (seules les indications entrant dans le cadre des RBP sont présentées)	POSOLOGIES (pour la rubrique complète, se référer au VIDAL)
AVK	Acénocoumarol Warfarine Fluindione	Traitement des Thromboses Veineuses Profondes (TVP) et de l'Embolie Pulmonaire (EP) et prévention de leurs récurrences, en relais de l'héparine.	En raison d'une importante variabilité interindividuelle, la posologie d'AVK par voie orale est strictement individuelle. Elle est à adapter en fonction de l'INR.
HNF	Héparine calcique	Prévention des accidents thrombo-emboliques veineux chez les patients alités, présentant une affection médicale aiguë.	La posologie habituelle est de 5000 UI toutes les 12 heures par voie SC.
		Traitement curatif des TVP constituées et de l'EP, à la phase aiguë.	La dose initiale est de 500 UI/ kg par 24 heures par voie SC, répartie en 2 ou 3 injections par jour, en fonction du volume à injecter. La dose sera ensuite adaptée en fonction du TCA
	Héparine sodique	Traitement curatif des TVP constituées et de l'EP, à la phase aiguë.	La dose initiale est de 20 UI/ kg /heure par voie IV. La dose sera ensuite adaptée en fonction du TCA
HBPM	Enoxaparine	Traitement prophylactique des TVP chez les patients alités pour une affection médicale aiguë.	4 000 UI anti-Xa/0,4 ml, à raison d'une injection par voie SC par jour.
		Traitement curatif des TVP constituées, avec ou sans EP sans signe de gravité clinique.	2 injections par jour espacées de 12 heures. La dose par injection est de 100 UI anti-Xa/kg par voie SC.
		Cancérologie : relais du traitement initial de la TVP proximale et de l'EP.	150 UI/kg par voie SC, une fois par jour.
	Daltéparine	Traitement prophylactique des TVP chez les patients alités pour une affection médicale aiguë.	5000 U.I. anti-Xa/0,2 ml, à raison d'une injection par voie SC par jour.
		Traitement curatif des TVP constituées.	2 injections par voie SC par jour, espacées de 12 heures. La dose par injection est de 100 UI anti-Xa/kg.
		Cancérologie : relais du traitement initial de la TVP proximale et de l'EP.	200 UI/kg par voie SC, une fois par jour pendant 1 mois puis 150 UI/kg une fois par jour.
	Tinzaparine	Traitement curatif des TVP constituées et des EP sans signes de gravité.	1 injection SC par jour. La dose par injection est de 175 UI anti-Xa/kg.
		Cancérologie : relais du traitement initial de la TVP proximale et de l'EP.	175 UI/kg par voie SC, une fois par jour.
	Nadroparine	Traitement curatif des TVP constituées.	Fraxiparine® : 2 injections par voie SC par jour par jour espacées de 12 heures ; la dose par injection est de 85 UI anti-Xa/kg. Fraxodi® : 1 injection de 171 UI anti-Xa/kg par jour.
Anti-thrombotique	Fondaparinux	Prévention des événements thrombo-emboliques veineux chez le patient, jugé à haut risque d'événements thrombo-emboliques veineux, alité pour une affection médicale aiguë	La posologie recommandée est de 2,5 mg, une fois par jour, administrée par injection SC.
		Traitement curatif des TVP aiguës et des EP aiguës.	La posologie recommandée est de 7,5 mg, une fois par jour, administrée par injection SC.